

कॅन बायोसिस उत्पादनांची किमया न्यारी ! कांदा व लसूण पिकाचे उत्तम संगोपन करी !!

सुपर क्वालिटी व भरघोस उत्पादन



एकसारख्या
आकाराचा कांदा



३०% पर्यंत
बचतीचा फायदा



८-१०% पर्यंत
अधिक उत्पन्न



८ महिन्यांपर्यंत कांदा
साठवणुकीत टिकतो



अधिक माहितीसाठी संपर्क करा

+91 84840 06196, +91 84840 06806



कांदा व लसूण पिकाचे वेळापत्रक

वाढ अवस्था/पीक संरक्षण	उत्पादने	वापरण्याचे प्रमाण	फायदे
रोपवाटिका नियोजन			
बीज प्रक्रिया	बी : सीपेल + ट्रायको-शील्ड कॉम्बॅट	बी:सीपेल ५ ग्रॅम + ट्रायको-शील्ड कॉम्बॅट ५ ग्रॅम / किलो बियाण्यास चोळून पेरणी करावी	<ul style="list-style-type: none"> निरोगी व चांगली उगवण मुळांचा जोमदार विकास जमिनीतून, बियाणांद्वारे पसरणाऱ्या बुरशींचे जैव व्यवस्थापन
रोग नियंत्रण (लागवडीनंतर १५ दिवसांनी)	सुडो + मिलॅस्टीन के	सुडो ५ ग्रॅम + मिलॅस्टीन के २.५ मिली / लिटर प्रमाणे फवारणी	<ul style="list-style-type: none"> सर्व प्रकारच्या बुरशीजन्य व जीवाणूजन्य रोगांचे प्रतिबंधात्मक नियंत्रण बदलत्या वातावरणामुळे होणाऱ्या रोगांचे प्रभावी नियंत्रण
कीड नियंत्रण (लागवडीनंतर ३० दिवसांनी)	ब्रिगेड-बी / ब्रिग बॉस	ब्रिगेड-बी ५ ग्रॅम किंवा ब्रिग बॉस ५ मिली / लिटर प्रमाणे फवारणी	<ul style="list-style-type: none"> सर्व प्रकारच्या रसशोषक किडींचे, हुमणीचे नियंत्रण किडींच्या सर्व अवस्थांवर प्रभावी नियंत्रण किडींच्या प्रभावी नियंत्रणासाठी अमावस्या व पौर्णिमेला फवारणी करावी
मर नियंत्रण (लागवडीनंतर ४५ दिवसांनी)	ट्रायको-शील्ड कॉम्बॅट	ट्रायको-शील्ड कॉम्बॅट १ किलो / एकर	<ul style="list-style-type: none"> रोपांची मर व मुळकुज थांबवते मातीतून होणारा हानिकारक बुरशींचा प्रादुर्भाव कमी करते
पुनर्लागवड नियोजन			
बेसल डोस	टीबी - ३ (दाणेदार) + ताबा - जी + स्पीड कंपोस्ट + ३३ कोटी	टीबी - ३ (दाणेदार) ३ किलो + ताबा - जी ४ किलो + स्पीड कंपोस्ट ४ किलो + ३३ कोटी १५० किलो / एकर	<ul style="list-style-type: none"> N, P, K आणि Zn चा शाश्वत पुरवठा पांढऱ्या मुळांची निरोगी वाढ संद्रिय कर्ब वाढीसाठी फायदेशीर संतुलित अन्नद्रव्यांचा पुरवठा
रोप लागवडीच्या वेळी (मर नियंत्रण)	टीबी - ३ : फर्टीडोस + ट्रायको-शील्ड कॉम्बॅट + मायकोझूट्स	टीबी - ३ : फर्टीडोस ५ मिली + ट्रायको-शील्ड कॉम्बॅट ५ ग्रॅम + मायकोझूट्स ३ ग्रॅम/लिटर प्रमाणे द्रावणात रोपे बुडवून लावावी	<ul style="list-style-type: none"> जमिनीतून पसरणाऱ्या बुरशींचे जैव व्यवस्थापन पांढऱ्या मुळांची निरोगी वाढ मुळांचा जोमदार विकास
पुनर्लागवडीनंतर १५ - २० दिवसांच्या कालावधीत	ताबा	ताबा २ मिली / लिटर प्रमाणे फवारणी	<ul style="list-style-type: none"> तणनाशक फवारणीनंतर येणाऱ्या तणावापासून मुक्तता
वाढीच्या अवस्थेत (पुनर्लागवडीच्या ३०, ४५, ६० दिवसांनी)	ताबा + व्हायटरमोन	ताबा २ मिली + व्हायटरमोन २ मिली / लिटर प्रमाणे फवारणी	<ul style="list-style-type: none"> सर्व प्रकारचे जैविक व अजैविक ताण नियंत्रण पिकांमध्ये जीवनसत्वे व संप्रेरक यांचे प्रमाण वाढवते निरोगी शाखीय वाढ
रोग नियंत्रण (करपा, पानांवरील ठिपके) (पुनर्लागवडीच्या ३०, ४५, ६० दिवसांनी)	सुडो/सुडो लिक्विड + मिलॅस्टीन के	सुडो ५ ग्रॅम किंवा सुडो लिक्विड ५ मिली + मिलॅस्टीन के २.५ मिली / लिटर प्रमाणे फवारणी	<ul style="list-style-type: none"> सर्व प्रकारच्या बुरशीजन्य व जीवाणूजन्य रोगांचे प्रतिबंधात्मक नियंत्रण बदलत्या वातावरणामुळे होणाऱ्या रोगांचे प्रभावी नियंत्रण
कीड नियंत्रण (लागवडीनंतर ३० दिवसांनी)	ब्रिगेड-बी / ब्रिग बॉस	ब्रिगेड-बी ५ ग्रॅम किंवा ब्रिग बॉस ५ मिली / लिटर प्रमाणे फवारणी	<ul style="list-style-type: none"> सर्व प्रकारच्या रसशोषक किडींचे, हुमणीचे नियंत्रण किडींच्या सर्व अवस्थांवर प्रभावी नियंत्रण किडींच्या प्रभावी नियंत्रणासाठी अमावस्या व पौर्णिमेला फवारणी करावी
हुमणी नियंत्रण	ब्रिगेड-बी	ब्रिगेड-बी २ किलो / एकर प्रमाणे जमिनीतून	<ul style="list-style-type: none"> हुमणी तसेच जमिनीतून पसरणाऱ्या किडींचे नियंत्रण
फळ फुगवण	टीबी - २ (दाणेदार) + ००:५२:३४ / ००:००:५०	टीबी - २ (दाणेदार) ४ किलो + ००:५२:३४ / ००:००:५० - ५-७ किलो / एकर प्रमाणे जमिनीतून	<ul style="list-style-type: none"> टिकवण क्षमता सुधारते फळांचा आकार गुणवत्ता रंग चकाकी व गोडी वाढवते उत्पादकता व गुणवत्ता सुधारते

ब्रिगेड-बी/ब्रिग बॉस - सिलीकॉन बेस स्टीकर 0.2 मिली/लिटर सोबत फवारणी केल्यास फायदेशीर किडींच्या सर्व अवस्थांवर प्रभावी नियंत्रणासाठी महिन्याच्या प्रत्येक अमावस्या व पौर्णिमेला वापरावे

कॅन बायोलॉजिस्टांच्या उत्पादनांचा वापर कॉपर आणि अॅन्टीबायोटिक सोबत करू नये.

उत्तम परिणामासाठी सकाळी किंवा सायंकाळी फवारणी करावी, फवारणी करताना फांधा व पाजे संपुर्ण भिजवावीत