


समृद्ध शेत पिकवा, विषमुक्त मोसंबी व संत्री मिळवा, 3D शक्तीच्या साथीने !

एक्सपोर्ट क्वालिटी, रेसिड्यू फ्री मोसंबी व संत्री



संपूर्ण पोषण व
जमीन अधिक
कसदार



गुंतवणुकीचा
पुरेपूर मोबदला



भरघोस फुलोरा
गुणवत्तापूर्ण उत्पादन



कीड व रोगाच्या जैविक
व्यवस्थापनासाठी उत्तम



ब्रिगेड-बी/ब्रीग बॉस + सिलीकॉन बेस स्टीकर 0.2 मिली/लिटर सोबत फवारणी केल्यास फायदेशीर

कॅन बायोसिसच्या उत्पादनांचा वापर कॉपर आणि अँटिबायोटिक सोबत करू नये. उत्तम परिणामासाठी सकाळी किंवा सायंकाळी फवारणी करावी. फवारणी करताना फांदया व पाने संपूर्ण भिजवावीत

आजच ऑर्डर करा

+91 84840 06196, +91 84840 06806



वाढ अवस्था/ पीक संरक्षण	उत्पादने	तापटण्याचे प्रमाण	उपयोग/फायदे
बेसल डीस (फळ धारणेच्या अवस्थेत पुन्हा रिपीट करावा)	टीबी - ३ + ताबा-जी+ स्पीड कंपोस्ट+ मायकोझूट्स + ३३ कोटी	टीबी ३ - ३ किलो + ताबा-जी ४ किलो + स्पीड कंपोस्ट ४ किलो +मायकोझूट्स २ किलो+ ३३ कोटी २०० किलो /एकर	<ul style="list-style-type: none"> ▶ N, P, K आणि Zn चा शाश्वत पुरवठा ▶ पांढऱ्या मुळांची निरोगी वाढ ▶ पिकाची जोमदार शाखीय वाढ ▶ सेंद्रिय कर्ब वाढीसाठी फायदेशीर
सूत्रकृमी नियंत्रणासाठी	नेमॅस्टीन+ ताबा ड्रीप	नेमॅस्टीन १ किलो + ताबा ड्रीप १ लिटर/ एकर प्रमाणे आळवणी किंवा ड्रीपने द्यावे	<ul style="list-style-type: none"> ▶ मुळांच्या सशक्त वाढीसाठी ▶ सूत्रकृमी नियंत्रणासाठी उपयुक्त
मर नियंत्रण (डिसेंबर , मार्च , जून, सप्टेंबर महिऱ्यात १५ ते २० दिवसांच्या दरम्यान)	ट्रायकोशील्ड कॉम्बॅट+ सुडो + ताबा ड्रीप	ट्रायकोशील्ड कॉम्बॅट २ किलो + सुडो १ किलो + ताबा ड्रीप १ लिटर/ एकर प्रमाणे आळवणी ने द्यावे	<ul style="list-style-type: none"> ▶ जमिनीतून पसरणाऱ्या बुरशीजन्य रोगांचा नियंत्रणासाठी उपयुक्त ▶ शेंडे वाळून झाडांची होणारी मर, मूळकूज, डायबॅक रोगांच्या प्रतिबंधात्मक नियंत्रणासाठी
वाढ अवस्था	ताबा + व्हायटरमोन	ताबा २ मिली + व्हायटरमोन २ मिली/लिटर प्रमाणे फवारणी करावी	<ul style="list-style-type: none"> ▶ पिकाची जैविक व अजैविक ताण सहन करण्याची शक्ती वाढवते. ▶ निरोगी शाखीय वाढ
फुलधारणा आणि फळधारणा	ताबा + व्हायटरमोन	ताबा २ मिली + व्हायटरमोन २ मिली/लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी	<ul style="list-style-type: none"> ▶ भरघोस फुलोरा ▶ फुल व फळ गळ नियंत्रणासाठी उपयुक्त
	टीबी ३ (फर्टीडोस)+ १३:४०:१३	टीबी ३ (फर्टीडोस) ५०० मिली + १३:४०:१३ - ५ किलो /एकर	<ul style="list-style-type: none"> ▶ P आणि K चा शाश्वत पुरवठा, उत्पादनात वाढ ▶ फळांचा आकार , वजन वाढवण्यासाठी
फुल व फळगळ, रस शोषक किडींच्या नियंत्रणासाठी (मार्च, जून , सप्टेंबर महिन्यात)	ताबा + व्हायटरमोन+ ब्रिगेड-बी	ताबा २ मिली + व्हायटरमोन २ मिली+ ब्रिगेड- बी ५ ग्रॅम/लिटर प्रमाणे फवारणी करावी	<ul style="list-style-type: none"> ▶ फळ काढणी अगोदर होणाऱ्या फुल व फळगळ नियंत्रणास प्रभावी ▶ भरघोस फुलोरा व अधिक फळधारणा ▶ रस शोषक कीड , खोड व फळ पोखरणारी अळी नियंत्रणासाठी
रोग नियंत्रण (कोळशी, फळांवर काळे डाग, डिव्या रोग)	सुडो + मिलॅस्टीन के	सुडो ५ ग्रॅम + मिलॅस्टीन के २.५ मिली + सिलिकॉन स्टिकर ०.२ मिली/लिटर प्रमाणे फवारणी करावी	<ul style="list-style-type: none"> ▶ पिकावरील बुरशीजन्य आणि जिवाणूजन्य रोगांचे जैव व्यवस्थापन ▶ पावसाळी तसेच अद्रतायुक्त वातावरणात, धुके असताना फवारणी अधिक फायदेशीर
कीड नियंत्रण (पाने खाणारी अळी, सिट्रस सायला, मिलीबग, नागअळी, पांढरी माशी, मावा, कोळी)	ब्रिगेड-बी/ब्रीग बॉस	फवारणी - ब्रिगेड-बी ५ ग्रॅम / ब्रीग बॉस ५ मिली+सिलिकॉन स्टिकर ०.२ मिली /लिटर जमिनीतून - ब्रिगेड-बी २ किलो/एकर ब्रीग बॉस १ लिटर	<ul style="list-style-type: none"> ▶ रस शोषक कीड , खोड व फळ पोखरणारी अळी, हुमणी नियंत्रणासाठी
फळ काढणीच्या १ महिन्याआधी	टीबी २ (फर्टीडोस)	टीबी २(फर्टीडोस) ५०० मिली+ ००:५२:३४/००:००:५० - ५-७ किलो/एकर प्रमाणे आळवणी ने द्यावे	<ul style="list-style-type: none"> ▶ P आणि K चा शाश्वत पुरवठा, उत्पादनात वाढ ▶ फळांचा गुणवत्ता, आकार, रंग, चकाकी व गोडी वाढवण्यासाठी