

कॅन बायोसिस उत्पादनांची किमया न्यारी ! सोयाबीन पिकाचे उत्तम संगोपन करी !!



जमीन अधिक
कसदार



रासायनिक खतांमध्ये बचत
(25% ते 30%पर्यंत)



उत्पादनात भरीव वाढ
(15% ते 20%)



कीड - रोग व्यवस्थापन
(रसशोषक कीड, बोंड अळी)



अधिक माहितीसाठी संपर्क करा

+91 84840 06196 | +91 84840 06806





सोयाबीनच्या विक्रमी उत्पादनासाठी कॅन बायोसिसचे जैविक तंत्र

वाढ अवस्था/ पीक संरक्षण	उत्पादन	वापरण्याचे प्रमाण	उपयोग /फायदे
बीजप्रक्रिया	बी-सीपेल आर.पी + ट्रायको-शील्ड कॉम्बॅट	बी-सीपेल आर.पी ५ ग्रॅम+ ट्रायको-शील्ड कॉम्बॅट - ५ ग्रॅम /किलो बियाण्याला चोळून पेरणी करावी	<ul style="list-style-type: none"> ▶ निरोगी आणि चांगली उगवण ▶ जमिनीतून पसरणाऱ्या बुरशीजन्य रोगांचे व्यवस्थापन ▶ मुळांचा जोमदार विकास
बेसल डोस	टीबी -३ + ताबा-जी+ स्पीड कंपोस्ट+३३ कोटी	टी.बी.-३ ३ किलो + ताबा जी ४ किलो + स्पीडकंपोस्ट ४ किलो + ३३ कोटी:फरमेंटेड जैविक खत -२०० किलो/एकर	<ul style="list-style-type: none"> ▶ N, P, K आणि Zn चा शाश्वत पुरवठा ▶ सैद्रिय कर्ब वाढीसाठी फायदेशीर ▶ पांढऱ्या मुळांची निरोगी वाढ ▶ पिकाची जोमदार शाखीय वाढ
वाढीच्या अवस्थेत	ताबा + व्हायटरमोन (लागवडीनंतर ३०,६०,९० व्या दिवशी)	ताबा २ मिली + व्हायटरमोन २ मिली/लि. पाण्यातून फवारणी करावी	<ul style="list-style-type: none"> ▶ जोमदार शाखीय वाढ ▶ फुलांच्या संख्येत वाढ ▶ जैविक व अजैविक ताणतणावांच्या परिस्थितीत फुल गळ होऊ देत नाही
कीड नियंत्रण (चक्री भुंगे, शेंग पोखरणारी अळी, केसाळ अळी, उंटअळी, पाने गुंडाळणारी अळी)	ब्रिगेड-बी/ ब्रीग बॉस महिन्याच्या प्रत्येक अमावस्येला व पौर्णिमेला फवारणी करावी	ब्रिगेड-बी ५ ग्रॅम / ब्रीग बॉस ५ मिली /लिटर पाण्यातून फवारणी करावी.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ सर्व प्रकारच्या रस शोषक कीड व अळी नियंत्रणासाठी
रोग नियंत्रण (करपा, मोझॅक, तांबेरा)	सुडो+मिलॅस्टीन के	सुडो ५ ग्रॅम + मिलॅस्टीन के २.५ मिली/लिटर	<ul style="list-style-type: none"> ▶ पानावरील बुरशीजन्य आणि जिवाणूजन्य रोगांचे जैव व्यवस्थापन ▶ जमिनीतून पसरणाऱ्या बुरशीजन्य रोगांचे व्यवस्थापन
शेंगा भरण्याच्या अवस्थेत	टीबी २	टीबी - २ दाणेदार २ किलो /एकर किंवा द्रवरूप - ५०० मिली/एकर जमिनीतून किंवा ड्रीप ने सोडावे	<ul style="list-style-type: none"> ▶ P आणि K चा शाश्वत पुरवठा ▶ पिकाच्या जोमदार वाढीस मदत

ब्रिगेड-बी/ब्रीग बॉस + सिलीकॉन बेस स्टीकर महिन्याच्या प्रत्येक अमावस्येला 0.2 मिली/लिटर सोबत फवारणी केल्यास फायदेशीर

कॅन बायोसिसच्या उत्पादनांचा वापर कॉपर आणि अँटिबायोटिक सोबत करू नये.
उत्तम परिणामासाठी सकाळी किंवा सायंकाळी फवारणी करावी.
फवारणी करताना फांदया व पाने संपूर्ण भिजवावीत

