

कॅन बायोलिस उत्पादनांची किमया न्यारी ! ऊस पिकाचे उत्तम संगोपन करी !!

रसदार, जोमदार, वाढीव वजनाचा ऊस



जमीन अधिक
कसदार



कीड व्यवस्थापन (शेंडे कीड,
खोड कीड, हुमणी)



वजनान्न
भरीव वाढ



रासायनिक खतांमध्ये बचत
(२५% ते ३०% पर्यंत)



अधिक माहितीसाठी संपर्क करा

+91 84840 06196 | +91 84840 06806



ऊस पिकाचे नैसर्गिक संरक्षण व अधिक उत्पादनासाठी कॅन बायोजिन्सच्या खालील उत्पादनांचा वापर करा

वाढ अवस्था	उत्पादने	वापरण्याचे प्रमाण	उपयोग /फायदे
बेणे प्रक्रिया	ट्रायको-शील्ड कॉम्बॅट+ मायकोझूट्स	ट्रायको-शील्ड कॉम्बॅट १० ग्रॅम + मायकोझूट्स ३ ग्रॅम/लि. पाण्याच्या द्रावणात बेणे बुडवून लागवड करावी	<ul style="list-style-type: none"> ▶ निरोगी आणि चांगली उगवण ▶ जमिनीतून पसरणाऱ्या बुरशीचे जैव व्यवस्थापन ▶ मुळांचा जोमदार विकास
बेसल डोस (लागवडीच्या वेळी व १२० दिवसांनी पुन्हा देणे)	टीबी -३+ताबा-जी+ स्पीड कंपोस्ट+३३ कोटी	टी.बी.३ - ३ किलो + ताबा जी ४ किलो + स्पीडकंपोस्ट ४ किलो +३३ कोटी:फरमेटेड सॅन्ड्रिय खत -२०० किलो / एकर	<ul style="list-style-type: none"> ▶ N, P, K आणि Zn चा शाश्वत पुरवठा ▶ पांढऱ्या मुळांची निरोगी वाढ ▶ पिकाची जोमदार शाखीय वाढ ▶ सॅन्ड्रिय कर्ब वाढीसाठी फायदेशीर
वाढीच्या अवस्थेत लागवडीनंतर ३०, ६०, ९० व्या दिवशी	ताबा + व्हायटरमोन	ताबा २ मिली + व्हायटरमोन २ मिली/ लिटर प्रमाणे फवारणी करावी	<ul style="list-style-type: none"> ▶ जोमदार शाखीय वाढ ▶ जैविक व अजैविक ताणतणावांच्या परिस्थितीत पिकाची प्रतिकार शक्ती वाढवते
सूत्रकृमी नियंत्रण मार्च, जून, सप्टेंबर आणि डिसेंबर (दर महिन्यातून एक वेळा द्यावे)	नेमॅस्टीन+ताबा ड्रीप	नेमॅस्टीन २ किलो + ताबा ड्रीप १ लिटर/एकर	▶ जमिनीतून होणारे बुरशीजन्य रोगांचे आणि सूत्रकृमींचे जैव व्यवस्थापन
रोग नियंत्रण (लाल कूज, पोक्का बोर्डिंग)	ट्रायको-शील्ड कॉम्बॅट +ताबा ड्रीप	ट्रायको-शील्ड कॉम्बॅट २ किलो +ताबा ड्रीप १ लिटर/एकर	<ul style="list-style-type: none"> ▶ जमिनीतून होणारे बुरशीजन्य रोगांचे जैव व्यवस्थापन ▶ लाल कूज, पोक्का बोर्डिंग, मर नियंत्रणासाठी
कीड नियंत्रण	ब्रिगेड-बी/ब्रीग बॉस महिन्याच्या प्रत्येक अमावस्येला व पौर्णिमेला फवारणी करावी	ब्रिगेड-बी ५ ग्रॅम किंवा ब्रीग बॉस ५ मिली/लि. पाण्यातून फवारणी करावी.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ रस शोषक कीड व खोड कीड, लोकरी मावा नियंत्रणासाठी ▶ मार्च आणि मे च्या पहिल्या आठवड्यात खोड कीड नियंत्रणासाठी
हुमणी नियंत्रण	ब्रिगेड-बी/ब्रीग बॉस	जमिनीतून ब्रिगेड-बी-२ किलो/एकर शेणखताबरोबर एकत्रित करून द्यावे	<ul style="list-style-type: none"> ▶ जमिनीतील किडींचे जैव व्यवस्थापन ▶ जुलै आणि ऑगस्ट च्या पहिल्या आठवड्यात हुमणी नियंत्रणासाठी
वजन वाढीसाठी	टी.बी-२	टीबी - २ दाणेदार - २ किलो किंवा द्रवरूप - ५०० मिली + ००:५२:३४/०:०:५० ५ ते ७ किलो/एकर जमिनीतून किंवा ड्रीप ने सोडावे	<ul style="list-style-type: none"> ▶ P आणि K चा शाश्वत पुरवठा, उत्पादनात वाढ ▶ ऊसाचे वजन, चव, गुणवत्ता वाढवण्यासाठी ▶ ऊस पे-यांची लांबी व जाडी वाढविण्यासाठी

ब्रिगेड-बी/ब्रीग बॉस - सिलीकॉन बेस स्टीकर 0.2 मिली/लिटर सोबत फवारणी केल्यास फायदेशीर

कॅन बायोजिन्सच्या उत्पादनांचा वापर कॉपर आणि ॲन्टीबायोटिक सोबत करू नये. उत्तम परिणामासाठी सकाळी किंवा सायंकाळी फवारणी करावी, फवारणी करताना फांघा व पाने संपुर्ण भिजवावीत